

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-6-8606.1570

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

(R)

Direction Régionale de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Corse

Bulletin Technique n° 79

du 29 Mai 1986

VIGNE



C'est le début floraison pour de nombreux cépages. Ces dix derniers jours se sont caractérisés par un temps chaud (avec des températures maxima jusqu'à 27°C - 28°C). Depuis le 27 mai les précipitations orageuses rendent les conditions météorologiques favorables aux maladies.

Mildiou : un traitement est nécessaire


Les foyers sont localisés sur la plaine orientale. On observe des fructifications sur feuilles, en vigne mal protégées, ainsi que des dégâts sur grappes.

Le traitement est à renouveler en ce début de floraison. Préférez les produits systémiques (ACYLON, Super F, VAMIN, CALTAN, CALTAN C, GALBEN GALBEN M, PULSAN, SIRDAT)

Oïdium : Préférez un soufrage en pleine floraison

Cicadelles de la flavescence dorée : premières sorties de larves

Elles ont été observées entre le 20 et le 27 mai. Ne pas intervenir pour le moment dans les zones atteintes.



Cochenilles farineuses : sorties des larves

Les jeunes larves sortent depuis le début de la semaine. Attention ! ce ravageur est en nette recrudescence. Les ceps atteints l'an passé se signalent par leur couleur noirâtre car ils se sont couverts de fumagine. Au moment de la récolte vous avez pu également observer que certaines grappes étaient envahies de petites cochenilles blanches. Sur tous les pieds atteints, il faut traiter dès la semaine prochaine. Visez bien le bas du feuillage.

Préférez : ULTRACIDE, LANNATE
EKALUX.

ou des produits à base de parathion

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur gérant M. COQUET

Publication Périodique
CPPAP N° 1769 A-D

ISSN
0759-9633

.../...

P48

Tordeuses de la grappe : fin du vol de 1 ère génération

On dénombre des glomerules depuis la fin de la semaine dernière, su BRAVONE, PIANICCIA, AGHIONE, ALERIA. le seul de 200 glomerules pour 100 grappes n'a jamais été observé dans nos comptages. Inutile donc de traiter sauf situation exceptionnelle :

Acariens jaunes et rouges : quelques foyers

Si 70 % des feuilles sont habitées, intervenez avec

tetrasul	ANIMERT
dicofol	N.S.
tetradifon	N.S.
dicofol + tetradifon	KELTHION

CULTURES LEGUMIERES


Acariens : température idéale pour la multiplication

Il faut protéger les cultures soit pré - ventivement, soit curativement, et en fonction du stade évolutif de la plante.

Un bassinage de celle-ci en période non humide ralentit le développement des acariens .

Vous avez le choix entre :

soufre en poudrage = repulsif des acariens
chinomethionate : MORESTAN action secondaire sur les acariens



Azocyclotin	PEROPAL
Benzomixate	ARTABAN
Binapacryl	AMBOX
Bromopropylate	NEORON
Chlorofenizon	TRICHLOR FENSON
Cyhexatin	Nb. Spécialités, PLICTRAN
Dicofol	Nb. Spécialités, KELTHANE
dicofol + Tetradifon	KELTHION
Fenbutatin oxyde	TORQUE
Fenizon	TRIEENSON
Tetrasul	ANIMERT

Oïdium : Soyez très vigilants surtout en serre

Se référer au n° 76 pour les produits à utiliser

:	:	:
:	bupirimate	: NIMROD, FISIONS
:	triadimefon	: BAYLETON
:	ne s'emploient qu'en plein champ	:
:	:	:

ARBRES FRUITIERS


Oïdium du pêcher : premiers dégâts sur fruits

Observez vos parcelles, et intervenez rapidement.

Tordeuse orientale protection des fruits

Intervenez dès la semaine prochaine

mevinphos	N.S.
dichlorvos	N.S.
azinphos ethyl et methyl	N.S.
carbaryl	SEVIN, KUMITAL
deltamethrine	DECIS
fenitrothion	N.S.
methidation	ULTRACIDE
methomyl	LANNATE
parathion	N.S.
phosalone	AZOPHENE, ZOLONE
deltamethrine	N.S.



:	:
: Attention aux délais d'emploi	:
: avant récolte	:
:	:

Maladies de conservation des pêches : intervenir après les orages

Durant les trois semaines qui précèdent la maturité, intervenir aussitôt après les orages avec :

iprodione	KIDAN, ROVRAL	délai	15 jours
vinchlozoline	RONILAN		15 jours
procymidone	SUMISCLEX		21 jours
folpel	N.S.		
captafol	DIFOSAN FLO, ORTHODIFOLATAN		sans délai
benomyl	BENLATE		"
triforine	SAPROL DENARIN		"

Agrumes = populations de pucerons noirs et verts en augmentation

Intervenez avec un aphicide spécifique dès la semaine prochaine

-----0000000-----